

● الرياضيات ، أليست هي الحقيقة؟! (أغسطس 1889 - 1971)

● جوهر الرياضيات هو الحرية (مورج كاتور 1845 - 1918)

● الموسيقى رياضيات مسموعة ، الرياضيات موسيقى صامتة (إدوارد هيريو 1872 - 1957)

التكبير والتصغير

أتذكر الدرس...

نسَمي تكبير أو تصغير شكل هندسي ، الشكل المحصل عليه بضرب كل
الشكل الهندسي الابتدائي بعدد موجب تماما k مع الاحتفاظ بأقياس


4 نعتبر الشكل أدناه ، حيث:

$(AR) \parallel (SE)$

$RC = 7 \text{ cm}$

$AR = 5 \text{ cm}$

$AC = 6 \text{ cm}$



المثلث SEC هو تصغير معامله 0,7 للمثلث ARC .
أكمل الجدول التالي:

| AR | RC | AC | المثلث ARC |
|-------|-------|-------|------------|
| | | | |
| ES | SC | EC | المثلث SEC |
| | | | |

5 (1) أنشئ مثلثا PIE حيث:

$PI = 2,6 \text{ cm}$

$\widehat{PIE} = 55^\circ$




(2) ضع النقاط M و N حيث: $N \in [EI]$, $M \in [EP]$

و NEM هو تكبير بمعامل 1,5 PIE

(3) حدّد قياس الزاوية MNE

في التمارين 1 إلى 3 ، المثلث

FOU هو تصغير للمثلث FAC .




1 إذا كان المثلث FAC متساوي الساقين في F ،
ما طبيعة المثلث FOU ؟ برّر إجابتك.

2 إذا كان المثلث FAC قائم في C ،
ما طبيعة المثلث FOU ؟ برّر إجابتك.


3 يعطى $AC = 5 \text{ cm}$ و $FA = 8 \text{ cm}$ ، $FO = 6 \text{ cm}$

(1) حدّد قيمة معامل التصغير.

(2) استنتج الطول OU




ليكن (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A
 لتكن B و M نقطتان من المستقيم (d) ، مختلفان عن A
 لتكن C و N نقطتان من المستقيم (d') ، مختلفان عن A
 إذا كان المستقيمان (BC) و (MN) ، فإن $\frac{AM}{AC} = \frac{AB}{BC} = \frac{AN}{NC}$



- (1) ضع النقطة B على $[OA]$ حيث $OB = \frac{2}{5}OA$
- (2) أنشئ المستقيم الموازي لـ (AM) المار بالنقطة B والذي يقطع المستقيم (OM) في نقطة N
- (3) برهن أن $ON = \frac{2}{5}OM$

.....

- (4) أنشئ الآن النقطة P على القطعة $[OM]$ حيث $OP = \frac{3}{5}OM$



- (1) برهن أن (FB) و (VP) متوازيان


.....

- (2) استنتج أن $PI = \frac{3}{2}IB$

.....

- (6) في الشكل أدناه:

- النقاط U, N و D في استقامية
- النقاط I, N و E في استقامية
- المستقيمان (ID) و (UE) متوازيان. أكمل:




المستقيمان و متقاطعان في
 إضافة إلى أن: //


إذن ، حسب خاصية طالس ، لدينا : $\frac{NI}{NU} = \frac{ID}{UE}$

- (7) من بين الأشكال أدناه ، اختر


تلك التي تحقق: $\frac{ED}{EF} = \frac{ET}{EC} = \frac{DT}{FC}$




النقاط D, E و F في استقامية ،
 النقاط T, E و C في استقامية ،
 و $(DT) // (FC)$



النقاط F, E و T في استقامية ،
 النقاط E, C و D في استقامية ،
 و $(DT) // (FC)$




النقاط D, E و F في استقامية ،
 النقاط T, E و C في استقامية ،
 و $(DT) // (FC)$



النقاط D, E و F في استقامية ،
 النقاط T, E و C في استقامية ،
 و $(FT) // (DC)$

10 في الشكل أدناه:

- النقاط C, I و T في استقامية
- النقاط A, I و L في استقامية
- المستقيمان (CA) و (LT) متوازيان




$$\begin{aligned} IA &= 2,5 \text{ cm} \\ LT &= 4 \text{ cm} \\ AC &= 3 \text{ cm} \\ IT &= 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

حدّد الطول LI

12 نعتبر الشكل أدناه حيث:

- النقاط S, E, R و T, E, U في استقامية
- و $(ST) // (UR)$



$$\begin{aligned} TE &= 48 \text{ mm} \\ TU &= 72 \text{ mm} \\ SE &= 36 \text{ mm} \end{aligned}$$

حدّد الطول ER

13 نعتبر مثلثا MOI قائما في O حيث:

$$OI = 6 \text{ cm} \text{ و } MO = 2,5 \text{ cm}; MI = 6,5 \text{ cm}$$

تكن النقطة C من $[IM]$ حيث $IC = 3 \text{ cm}$

الدائرة التي قطرها $[IC]$ تقطع الضلع $[OI]$ في L

(1) أنشئ الشكل




(2) ما طبيعة المثلث CIL ؟

(3) أحسب الطول CL

11

نعتبر الشكل أدناه حيث


- L, J, I و L, K, M في استقامية



$$\begin{aligned} LJ &= 10 \text{ cm} \\ LI &= 15 \text{ cm} \\ LK &= 8 \text{ cm} \end{aligned}$$

(1) أحسب الطول JK



(2) استنتج الطول IM



ليكن (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A
 لتكن B و M نقطتان من المستقيم (d) ، تختلفان عن A
 لتكن C و N نقطتان من المستقيم (d') ، تختلفان عن A
 إذا كان $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ وكانت النقاط M, A, B و N, A, C
 فإنَّ المستقيمان (MN) و (BC)

16 من مواضيع Bern France

(1) برهن أنَّ المستقيمان (DE) و (AB) متوازيان .
 (2) استنتج أنَّ المثلث ABC قائم




- النقاط D, N و U في استقامية
 - النقاط I, N و E في استقامية

المستقيمان و متقاطعان في
 لدينا $\frac{NI}{NE} = \dots\dots\dots$
 و $\frac{ND}{NU} = \dots\dots\dots$

نلاحظ أنَّ $\frac{NI}{NE} \dots\dots\dots \frac{ND}{NU}$


إضافة إلى أنَّ I, N, E و D, N, U
 إذن ، حسب خاصية طالس العكسية ، المستقيمان (UE) و (ID)

17





النقاط A, C و F, C في استقامية ، كذلك B, C و G, C
 هل المستقيمان (FG) و (AB) متوازيان؟

15



- النقاط A, U و R في استقامية
 - النقاط I, R و E في استقامية
 برهن أنَّ المستقيمان (UE) و (AI) متوازيان .

لكل سؤال من الأسئلة التالية ، ضع إطار حول الإجابة (أو الأجوبة) الصحيحة .
 تنبيه: قد تكون هناك عدة إجابات دقيقة لنفس العبارة ! يجب العثور عليهم جميعا .

| النص | A | B | C |
|---|---|---|---|
| <p>● من أجل الأسئلة من 18 إلى 22 ، نعتبر الشكل المقابل حيث النقاط A, B, L و A, B, C في استقامية ، كذلك النقاط R و C</p>  | | | |
| 18 إذا كان المثلث BAR تصغير بمعامل 0,6 للمثلث LAC ، فإنَّ | $LC = 0,6$ | $BR = 0,6 \times LC$ | $LC = 0,6 \times BR$ |
| 19 إذا كان المثلث LAC تكبير بمعامل 1,8 للمثلث BAR ، فإنَّ | $\widehat{ALC} = \widehat{ABR}$ | $\widehat{ALC} = 1,8 \times \widehat{ABR}$ | $\widehat{ABR} = 1,8 \times \widehat{ALC}$ |
| 20 إذا كان $(BR) \parallel (LC)$, $AB = 5 \text{ cm}$, $AL = 8 \text{ cm}$ و $BR = 3 \text{ cm}$ فإنَّ | $LC = 1,875 \text{ cm}$ | $LC = 4,8 \text{ cm}$ | $LC = \frac{24}{5} \text{ cm}$ |
| 21 إذا كان $(BR) \parallel (LC)$, $AR = 8 \text{ cm}$, $RC = 6 \text{ cm}$ و $AL = 9 \text{ cm}$ فإنَّ | $AB = 5,14 \text{ cm}$ | $AB = \frac{36}{7} \text{ cm}$ | $AB = 12 \text{ cm}$ |
| 22 إذا كان $AR = 2,1 \text{ cm}$, $AC = 3,5 \text{ cm}$, $AL = 2 \text{ cm}$ و $AB = 1,2 \text{ cm}$ فإنَّ | المستقيمان (LC) و (BR) متوازيان | المستقيمان (LC) و (BR) ليسا متوازيان | $BR = 1,6 \text{ cm}$ |
| <p>● من أجل الأسئلة من 23 إلى 27 ، نعتبر الشكل المقابل حيث النقاط A, K, E و A, K, I, R في استقامية ، كذلك النقاط K, I و R</p>  | | | |
| 23 نفرض أنَّ $(AI) \parallel (RE)$ وفقا لخاصية طالس ، لدينا: | $\frac{AK}{AE} = \frac{IK}{IR} = \frac{AI}{RE}$ | $\frac{KA}{KE} = \frac{KR}{KI} = \frac{AI}{RE}$ | $\frac{KA}{KE} = \frac{KI}{KR} = \frac{AI}{RE}$ |
| 24 إذا كان $(AI) \parallel (RE)$, $AK = 4,5 \text{ cm}$, $RE = 2 \text{ cm}$ و $KE = 3 \text{ cm}$ فإنَّ | $AI = 2 \text{ cm}$ | $AI = 3 \text{ cm}$ | $AI = 3,33 \text{ cm}$ |
| 25 إذا كان $(AI) \parallel (RE)$, $AI = 4 \text{ cm}$, $RE = 7 \text{ cm}$ و $KI = 5 \text{ cm}$ فإنَّ | $KR = \frac{35}{4} \text{ cm}$ | $KR = \frac{20}{7} \text{ cm}$ | $KR = \frac{28}{5} \text{ cm}$ |
| 26 إذا كان $AK = 6,3 \text{ cm}$, $KE = 3,5 \text{ cm}$, $KR = 2 \text{ cm}$ و $KI = 3,6 \text{ cm}$ فإنَّ | المستقيمان (AI) و (RE) متوازيان | المستقيمان (AI) و (RE) ليسا متوازيان | المستقيمان (AR) و (IE) متوازيان |
| 27 إذا كان $AK = 6 \text{ cm}$, $KE = 4 \text{ cm}$, $KR = 4,5 \text{ cm}$ و $IK = 3 \text{ cm}$ فإنَّ | المستقيمان (AI) و (RE) متوازيان | المستقيمان (AI) و (RE) ليسا متوازيان | المستقيمان (AR) و (IE) متوازيان |

● الرياضيات ، أليست هي الحقيقة؟! (أغسطس 1889 - 1971)

● جوهر الرياضيات هو الحرية (مورج كاتور 1845 - 1918)

● الموسيقى رياضيات مسموعة ، الرياضيات موسيقى صامتة (إدوارد هيريو 1872 - 1957)

التكبير والتصغير

أتذكر الدرس...

نسَمي تكبير أو تصغير شكل هندسي ، الشكل المحصل عليه بضرب كل
الشكل الهندسي الابتدائي بعدد موجب تماما k مع الاحتفاظ بأقياس

أطوال

الزوايا


4 نعتبر الشكل أدناه ، حيث:

$(AR) \parallel (SE)$

$RC = 7 \text{ cm}$

$AR = 5 \text{ cm}$

$AC = 6 \text{ cm}$




المثلث SEC هو تصغير معامله 0,7 للمثلث ARC .
أكمل الجدول التالي:

| AR | RC | AC | المثلث ARC |
|--------|--------|--------|------------|
| 5 cm | 7 cm | 6 cm | |
| 3,5 cm | 4,9 cm | 4,2 cm | المثلث SEC |
| ES | SC | EC | |

5 (1) أنشئ مثلثا PIE حيث:

$PI = 2,6 \text{ cm}$

$\widehat{PIE} = 55^\circ$



(2) ضع النقاط M و N حيث: $N \in [EI]$, $M \in [EP]$


و NEM هو تكبير بمعامل 1,5 PIE

(3) حدّد قياس الزاوية \widehat{MNE}

التكبير يحفظ أقياس الزوايا ، إذن $\widehat{MNE} = \widehat{PIE} = 55^\circ$

في التمارين 1 إلى 3 ، المثلث

FOU هو تصغير للمثلث FAC .



1 إذا كان المثلث FAC متساوي الساقين في F ،

ما طبيعة المثلث FOU ؟ برّر إجابتك .

المثلث FOU هو تصغير للمثلث FAC ، إذن $FU = k \times FC$

و $FO = k \times FA$

كذلك ، FAC مثلث متساوي الساقين في F ، إذن $FC = FA$

نستنتج أن $FU = FO$ ، والمثلث FOU متساوي الساقين في F

2 إذا كان المثلث FAC قائم في C ،

ما طبيعة المثلث FOU ؟ برّر إجابتك .

المثلث FAC قائم في C ، إذن $\widehat{FCA} = 90^\circ$

التصغير يحفظ أقياس الزوايا ، إذن $\widehat{FCA} = \widehat{FUO} = 90^\circ$

المثلث FOU إذن قائم في U

3 يعطى $AC = 5 \text{ cm}$ و $FA = 8 \text{ cm}$ ، $FO = 6 \text{ cm}$


(1) حدّد قيمة معامل التصغير .

يعطى معامل التصغير بالعلاقة:

$$k = \frac{FO}{FA} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0,75$$


(2) استنتج الطول OU

$$OU = k \times AC = \frac{3}{4} \times 5 = 3,75 \text{ cm}$$



ليكن (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A
لتكن B و M نقطتان من المستقيم (d) ، مختلفان عن A
لتكن C و N نقطتان من المستقيم (d') ، مختلفان عن A
إذا كان المستقيمان (BC) و (MN) متوازيين ، فإن $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

8 نعتبر الشكل



أدناه: OMA

(1) ضع النقطة B على $[OA]$ حيث $OB = \frac{2}{5} OA$

(2) أنشئ المستقيم الموازي لـ (AM) المار بالنقطة B والذي يقطع المستقيم (OM) في نقطة N

(3) برهن أن $ON = \frac{2}{5} OM$

المستقيم (MN) و (AB) متقاطعان في النقطة O

كذلك ، $(BN) \parallel (AM)$


إذن ، حسب خاصية طالس ، لدينا:

$$\frac{2}{5} = \frac{ON}{OM} = \frac{BN}{AM} \text{ فيكون } \frac{OB}{OA} = \frac{ON}{OM} = \frac{BN}{AM}$$

وبالتالي $ON = \frac{2}{5} OM$

(4) أنشئ الآن النقطة P على القطعة $[OM]$ حيث $OP = \frac{3}{5} OM$

9



(1) برهن أن (FB) و (VP) متوازيان

نعلم أن الزاويتان \widehat{PVI} و \widehat{IFB} متبادلتان داخليتا من أجل

(FB) و (VP) اللذان يقطعهما (FV) ، وهما بنفس القياس .

إذن $(VP) \parallel (FB)$

خاصية 1 ص 140 من الكتاب المدرسي الثانية متوسط

(2) استنتج أن $PI = \frac{3}{2} IB$

إضافة لما سبق ، (BP) و (VF) متقاطعان في I

إذن ، حسب خاصية طالس ، لدينا:


$$PI = \frac{3}{2} IB \text{ و } \frac{IP}{IB} = \frac{3}{2} \text{ ومنه } \frac{IP}{IB} = \frac{IV}{IF} = \frac{PV}{FB}$$

6 في الشكل أدناه:

- النقاط U, N و D في استقامية

- النقاط I, N و E في استقامية

- المستقيمان (ID) و (UE) متوازيان. أكمل:




المستقيمان (IE) و (DU) متقاطعان في N

إضافة إلى أن: $(ID) \parallel (EU)$


إذن ، حسب خاصية طالس ، لدينا: $\frac{NI}{NE} = \frac{ND}{NU} = \frac{ID}{EU}$

7 من بين الأشكال أدناه ، اختر


$$\frac{ED}{EF} = \frac{ET}{EC} = \frac{DT}{FC}$$




النقاط D, E و F في استقامية ،
النقاط E, T و C في استقامية ،
و $(DT) \parallel (FC)$



النقاط F, E و T في استقامية ،
النقاط E, C و D في استقامية ،
و $(DT) \parallel (FC)$




النقاط D, E و F في استقامية ،
النقاط T, E و C في استقامية ،
و $(DT) \parallel (FC)$



النقاط D, E و F في استقامية ،
النقاط T, E و C في استقامية ،
و $(FT) \parallel (DC)$

10 في الشكل أدناه:

- النقاط C, I و T في استقامية
- النقاط A, I و L في استقامية
- المستقيمان (CA) و (LT) متوازيان



$$\begin{aligned} IA &= 2,5 \text{ cm} \\ LT &= 4 \text{ cm} \\ AC &= 3 \text{ cm} \\ IT &= 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

حدّد الطول LI

المستقيمان (LA) و (CT) متقاطعان في I

إضافة إلى ذلك، $(AC) \parallel (LT)$

إذن، حسب خاصية طالس، لدينا:


$$\frac{LI}{2,5} = \frac{6}{3} = \frac{4}{3} \quad \text{ومنه} \quad \frac{LI}{2,5} = \frac{4}{3} \quad \text{و} \quad \frac{IL}{IA} = \frac{IT}{AC} = \frac{LT}{AC}$$

حساب الطول LI :

$$LI = \frac{10}{3} \text{ cm} \quad \text{إذن} \quad 3 \times LI = 2,5 \times 4$$

11 نعتبر الشكل أدناه حيث

L, J, I و L, K, M في استقامية



$$LJ = 10 \text{ cm}$$

$$LI = 15 \text{ cm}$$

$$LK = 8 \text{ cm}$$

(1) أحسب الطول JK

نعلم أنّ المثلث JKL قائم في K

حسب مبرهنة فيثاغورس، لدينا:

$$10^2 = 8^2 + JK^2 \quad \text{إذن} \quad LJ^2 = LK^2 + KJ^2$$

$$\text{ومنه} \quad JK^2 = 100 - 64 \quad \text{و} \quad JK^2 = 36$$

$$\text{ولأن} \quad JK > 0 \quad \text{إذن} \quad JK = 6 \text{ cm}$$

(2) استنتج الطول IM

نعلم أنّ $(LM) \perp (MI)$ و $(LK) \perp (KI)$

إذن $(JK) \parallel (MI)$

إضافة إلى ذلك، النقاط L, J, I و L, K, M في استقامية

إذن، حسب خاصية طالس، لدينا:

$$\frac{10}{15} = \frac{8}{IM} = \frac{6}{IM} \quad \text{ومنه} \quad \frac{LJ}{LI} = \frac{LK}{LM} = \frac{JK}{IM}$$

حساب الطول IM :

$$10 \times IM = 15 \times 6 \quad \text{إذن} \quad IM = \frac{90}{10} \quad \text{ومنه} \quad IM = 9 \text{ cm}$$

12 نعتبر الشكل أدناه حيث:

- النقاط S, E, R و T, E, U في استقامية

- و $(ST) \parallel (UR)$

$$TE = 48 \text{ mm}$$

$$TU = 72 \text{ mm}$$

$$SE = 36 \text{ mm}$$

حدّد الطول ER

نعلم أنّ النقاط S, E, R و T, E, U في استقامية وأنّ

$(ST) \parallel (UR)$

إذن، حسب خاصية طالس، لدينا:

$$\frac{48}{72 - 48} = \frac{36}{ER} = \frac{ST}{UR} \quad \text{ومنه} \quad \frac{ET}{EU} = \frac{ES}{ER} = \frac{ST}{UR}$$

حساب الطول ER :

$$ER = 18 \text{ mm} \quad \text{إذن} \quad 48 \times ER = 24 \times 36$$


13 نعتبر مثلثا MOI قائما في O حيث:

$$OI = 6 \text{ cm} \quad \text{و} \quad MO = 2,5 \text{ cm}; \quad MI = 6,5 \text{ cm}$$

لتكن النقطة C من $[IM]$ حيث $IC = 3 \text{ cm}$

الدائرة التي قطرها $[IC]$ تقطع الضلع $[OI]$ في L

(1) أنشئ الشكل



(2) ما طبيعة المثلث CIL ؟

CIL محاط بالدائرة ϕ ذات القطر $[IC]$ إذن المثلث CIL قائم في L

خاصية 2 ص 154 الكتاب المدرسي ثلاثة متوسط

(3) أحسب الطول CL

$(LC) \perp (OI)$ و $(OI) \perp (OM)$ إذن $(LC) \parallel (OM)$

إضافة إلى ذلك، النقاط O, L, I و M, C, I في استقامية


إذن، حسب خاصية طالس، لدينا:

$$\frac{IL}{6} = \frac{3}{6,5} = \frac{LC}{2,5} \quad \text{ومنه} \quad \frac{IL}{IO} = \frac{IC}{IM} = \frac{LC}{OM}$$

حساب الطول LC :


$$LC = \frac{15}{13} \text{ cm} \quad \text{إذن} \quad 6,5 \times LC = 3 \times 2,5$$

خاصية طالس العكسية



ليكن (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A
 لتكن B و M نقطتان من المستقيم (d) ، تختلفان عن A
 لتكن C و N نقطتان من المستقيم (d') ، تختلفان عن A
 إذا كان $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ وكانت النقاط M, A, B و N, A, C
 فإن المستقيمان (BC) و (MN) موازيان

16 من مواضيع Bem France



(AD) و (BE) متقاطعان في C
 (1) برهن أن المستقيمان (AB) و (DE) متوازيان.

المستقيمان (AD) و (BE) متقاطعان في C
 $\frac{CD}{CA} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ و $\frac{CE}{CB} = \frac{14}{42} = \frac{1}{3}$

نلاحظ أن $\frac{CD}{CA} = \frac{CE}{CB}$


إضافة إلى أن D, C, A و B, C, E مرتبة بنفس الترتيب

إذن ، حسب خاصية طالس العكسية ، لدينا $(AB) \parallel (DE)$

(2) استنتج أن المثلث ABC قائم

إضافة لما سبق $(DE) \perp (DA)$ إذن $(AB) \perp (DA)$ ، و ABC قائم في A

خاصية 2 ص 106 من الكتاب المدرسي للسنة الثانية متوسط



النقاط A, C و F في استقامية ، كذلك B, C و G
 هل المستقيمان (AB) و (FG) متوازيان؟

المستقيمان (AF) و (BG) متقاطعان في C


$\frac{AC}{CF} = \frac{2,25}{8,4} = \frac{20 \times 2,25}{20 \times 8,4} = \frac{45}{168} = \frac{15}{56}$

و $\frac{BC}{CG} = \frac{1,5}{5,6} = \frac{10 \times 1,5}{10 \times 5,6} = \frac{15}{56}$

نلاحظ أن $\frac{AC}{CF} = \frac{BC}{CG}$

إضافة إلى أن A, C, F و B, C, G مرتبة بنفس الترتيب

إذن ، حسب خاصية طالس العكسية ، لدينا $(AB) \parallel (FG)$



- النقاط U, N و D في استقامية
 - النقاط I, N و E في استقامية


المستقيمان (IE) و (DU) متقاطعان في N
 لدينا $\frac{NI}{NE} = \frac{5,6}{3,5} = \frac{56}{35} = \frac{8 \times 7}{5 \times 7} = \frac{8}{5}$

و $\frac{ND}{NU} = \frac{4}{2,5} = \frac{4 \times 2}{2,5 \times 2} = \frac{8}{5}$

نلاحظ أن $\frac{NI}{NE} = \frac{ND}{NU}$

إضافة إلى أن I, N, E و D, N, U مرتبة بنفس الترتيب

إذن ، حسب خاصية طالس العكسية ، المستقيمان (UE) و (ID) متوازيان



- النقاط U, A و R في استقامية
 - النقاط R, I و E في استقامية

برهن أن المستقيمان (UE) و (AI) متوازيان.



المستقيمان (AU) و (IE) متقاطعان في R
 $\frac{RI}{RE} = \frac{12}{16} = \frac{4 \times 3}{4 \times 4} = \frac{3}{4}$ و $\frac{RA}{RU} = \frac{9}{12} = \frac{3 \times 3}{3 \times 4} = \frac{3}{4}$

نلاحظ أن $\frac{RI}{RE} = \frac{RA}{RU}$

إضافة إلى أن R, I, E و R, A, U مرتبة بنفس الترتيب


إذن ، حسب خاصية طالس العكسية ، المستقيمان (UE) و (AI) متوازيان

لكل سؤال من الأسئلة التالية ، ضع إطار حول الإجابة (أو الأجوبة) الصحيحة.
 تنبيه: قد تكون هناك عدة إجابات دقيقة لنفس العبارة! يجب العثور عليهم جميعا.

| النص | A | B | C |
|---|---|---|---|
| <p>● من أجل الأسئلة من 18 إلى 22 ، نعتبر الشكل المقابل حيث النقاط A, B, L و A, B, C في استقامية ، كذلك النقاط R و C</p>  | | | |
| 18 إذا كان المثلث BAR تصغير بمعامل 0,6 للمثلث LAC ، فإنَّ | $LC = 0,6$ | $BR = 0,6 \times LC$ | $LC = 0,6 \times BR$ |
| 19 إذا كان المثلث LAC تكبير بمعامل 1,8 للمثلث BAR ، فإنَّ | $\widehat{ALC} = \widehat{ABR}$ | $\widehat{ALC} = 1,8 \times \widehat{ABR}$ | $\widehat{ABR} = 1,8 \times \widehat{ALC}$ |
| 20 إذا كان $(BR) \parallel (LC)$, $AB = 5 \text{ cm}$, $BR = 3 \text{ cm}$ و $AL = 8 \text{ cm}$ ، فإنَّ | $LC = 1,875 \text{ cm}$ | $LC = 4,8 \text{ cm}$ | $LC = \frac{24}{5} \text{ cm}$ |
| 21 إذا كان $(BR) \parallel (LC)$, $AR = 8 \text{ cm}$, $RC = 6 \text{ cm}$ و $AL = 9 \text{ cm}$ ، فإنَّ | $AB = 5,14 \text{ cm}$ | $AB = \frac{36}{7} \text{ cm}$ | $AB = 12 \text{ cm}$ |
| 22 إذا كان $AR = 2,1 \text{ cm}$, $AC = 3,5 \text{ cm}$, $AB = 1,2 \text{ cm}$ و $AL = 2 \text{ cm}$ ، فإنَّ | المستقيمان (LC) و (BR) متوازيان | المستقيمان (LC) و (BR) ليسا متوازيان | $BR = 1,6 \text{ cm}$ |
| <p>● من أجل الأسئلة من 23 إلى 27 ، نعتبر الشكل المقابل حيث النقاط A, K, E و A, K, I, R في استقامية ، كذلك النقاط K, I و R</p>  | | | |
| 23 نفرض أنَّ $(AI) \parallel (RE)$ وفقا لخاصية طالس ، لدينا: | $\frac{AK}{AE} = \frac{IK}{IR} = \frac{AI}{RE}$ | $\frac{KA}{KE} = \frac{KR}{KI} = \frac{AI}{RE}$ | $\frac{KA}{KE} = \frac{KI}{KR} = \frac{AI}{RE}$ |
| 24 إذا كان $(AI) \parallel (RE)$, $AK = 4,5 \text{ cm}$, $RE = 2 \text{ cm}$ و $KE = 3 \text{ cm}$ ، فإنَّ | $AI = 2 \text{ cm}$ | $AI = 3 \text{ cm}$ | $AI = 3,33 \text{ cm}$ |
| 25 إذا كان $(AI) \parallel (RE)$, $AI = 4 \text{ cm}$, $RE = 7 \text{ cm}$ و $KI = 5 \text{ cm}$ ، فإنَّ | $KR = \frac{35}{4} \text{ cm}$ | $KR = \frac{20}{7} \text{ cm}$ | $KR = \frac{28}{5} \text{ cm}$ |
| 26 إذا كان $AK = 6,3 \text{ cm}$, $KE = 3,5 \text{ cm}$, $KR = 2 \text{ cm}$ و $KI = 3,6 \text{ cm}$ ، فإنَّ | المستقيمان (AI) و (RE) متوازيان | المستقيمان (AI) و (RE) ليسا متوازيان | المستقيمان (AR) و (IE) متوازيان |
| 27 إذا كان $AK = 6 \text{ cm}$, $KE = 4 \text{ cm}$, $KR = 4,5 \text{ cm}$ و $IK = 3 \text{ cm}$ ، فإنَّ | المستقيمان (AI) و (RE) متوازيان | المستقيمان (AI) و (RE) ليسا متوازيان | المستقيمان (AR) و (IE) متوازيان |



والآن ،
هل يمكنك تقدير ارتفاع
تاج محل ؟



صفحة: فيلذني الرياضيات

ترجمة الاستاذ: عبد الحفيظ عادل